

BRESKVE, ŠLJIVE, NEKTARINE

VREME PRIMENE/FAZA RAZVOJA	PREPARAT (fertigaciono)	PREPARAT (folijarno)	CILJ TRETIRANJA
početak vegetacije	Horty Profi 12 40 12 (60-80 kg/ha)	Horty Profi 12 40 12 (0,2-0,5% konc.)	Za uspješan i zdrav početak rasta biljke, za stimuliranje rasta korenovog sistema
cvetanje		Horty Profi BOR (1-3 kg/ha)	Bor je neophodan za klijanje polena (oplodnja), stimulira nastanak plodova i utječe na sintezu šećera; za bolju oplodnju, za veće prinose
tek zametnuti plodovi	Horty Profi 18 18 18 (60-80 kg/ha) ili Horty Profi 20 20 20 (60-80 kg/ha)	Horty Profi 18 18 18 (0,2-0,5 % konc.) ili Horty Profi 20 20 20 (0,2-0,5 % konc.) ili Horty foliarni (300-500 ml/100 l vode)	Za zdrav rast, bolju fotosintezu
početak razvoja plodova		Horty integrator (200-250 g/100 l vode)	Za ravnomerno dozrevanje plodova i njihovu bolju trajnost nakon berbe
razvoj plodova	Horty Profi 8 12 30 (80-100 kg/ha)	Horty Profi 8 12 30 (do 0,5% konc.) ili Horty SVV plus (500 ml/100 l vode, max. 2,5 l/ha)	Za lepšu obojenost, za ravnomerno dozrevanje, za više šećera u plodu
plodovi u zrenju	Horty Profi 8 12 30 (60-80 kg/ha)	Horty Profi 8 12 30 (do 0,5% konc.) ili Horty SVV plus (500 ml/100 l vode, max. 2,5 l/ha)	Za lepšu obojenost, za ravnomerno dozrevanje, za više šećera u plodu
		Horty Ca stimulator (300-500 ml/100l vode; max 3-5 l/ha)	Za jačanje čvrstine ćelijskih zidova u plodu
Kod pojave hloroze lišća: Horty Fe kelat (folijarno: 0,1-0,2% konc.) 2x do poboljšanja stanja			

Fertirigacija: preporučene su nedeljne doze. Doze mogu da se podele na manje količine i nedeljno apliciraju dva do tri puta.

Folijarno: prihranu preko lista izvoditi svakih 10-14 dana istovremeno sa zaštitom.

Đubriva se mogu koristiti zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, osim sa preparatima na bazi bakra, sumpora i ulja. Pre upotrebe se preporučuje test kompatibilnosti. Za vreme jakog sunca đubrenje se ne preporučuje. Ako je nakon folijarne primene (manje od 6 sati) pala povećana količina kiše, potrebno je ponoviti đubrenje sledeći dan.

Đubriva Horty Profi prethodno rastvoriti u kanti, sačekati da se kristali dobro navlaže. Nakon toga izmerenu količinu sredstava uliti kroz sito u rezervoar prskalice koji je napunjen do polovine sa potrebnom količinom vode. Uz stalno mešanje dodajemo vodu do potrebne količine.

Dodatne informacije na: www.tki.si